

醫療程序資訊 – 肉毒桿菌素注射

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. b 肉毒桿菌素是甚麼？

- 1.1. 肉毒桿菌素 (Botulinum Toxin) 是由肉毒桿菌分泌的一種神經毒素蛋白，能夠抑制神經末梢釋放乙醯膽鹼 (Acetylcholine)，阻隔神經訊息傳遞，使放鬆肌肉，繼而萎縮肌肉。
- 1.2. 肉毒桿菌素共有八種類型 (A, B, C1, C2, D, E, F and G)。
- 1.3. 一般而言注射後 3-4 天開始出現效果，大約 7 天明顯改善，可維持約 3 至 6 個月，治療效果因人而異。

2. 常見治療範圍

- 2.1. 原發性面部多汗症 (出汗過度)
- 2.2. 眼瞼痙攣 (眼皮跳)
- 2.3. 旋轉性頸部肌張力障礙 (嚴重的頸肩肌肉痙攣)
- 2.4. 面肌痙攣
- 2.5. 咀嚼肌肥大
- 2.6. 面部皺紋和細紋

3. 治療禁忌

- 3.1. 懷孕/正母乳餵哺
- 3.2. 患有神經肌肉疾病 (例如多發性硬化症、重症肌無力和貝爾麻痺)
- 3.3. 癲癇
- 3.4. 皮膚炎/皮膚感染
- 3.5. 肉毒桿菌素過敏
- 3.6. 服用以下藥物 - 青黴胺、氨基糖苷類抗生素和鈣阻滯劑
- 3.7. 皮膚癌
- 3.8. 蟹足腫
- 3.9. 身體畸形恐懼症
- 3.10. 免疫力不足
- 3.11. 不現實的期望

4. 程序前須知

- 4.1. 最少 24 小時內避免飲用酒精類飲品。
- 4.2. 一星期前停止服用消炎藥、抗凝血藥、阿士匹林 (乙酰水楊酸) 或中藥。如有疑問，請與醫生查詢。
- 4.3. 一星期前治療位置不宜作果酸換膚或創傷性的激光治療。
- 4.4. 治療前後之部位或需接受攝影，以作治療進度之參考和記錄。

5. 風險及併發症

- 5.1. 疼痛/ 腫脹 /皮膚紅癢/出血
- 5.2. 感染
- 5.3. 特異質反應 (例如頭痛、皮疹、頭暈)
- 5.4. 上瞼下垂/ 眉毛下垂
- 5.5. 不自然的面部表情/外觀

Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 – 肉毒桿菌素注射

- 5.6. 不理想的眉毛形狀
- 5.7. 不滿意的結果
- 5.8. 不對稱
- 5.9. 傷害附近皮膚組織
- 5.10. 肌肉僵硬或無力
- 5.11. 發炎後的皮膚色素增生
- 5.12. 過敏反應
- 5.13. 形成血腫
- 5.14. 吞嚥/ 呼吸困難
- 5.15. 過度/不足 矯正 或 無校正
- 5.16. 肉毒桿菌毒素抗體

6. 程序後須知

- 6.1. 注射部位可能會紅腫，有輕微疼痛或瘀青，通常在數小時後消退。如果症狀持續，請諮詢醫生。

7. 注意事項

- 7.1. 治療後可正常活動。
- 7.2. 療程 24 小時內避免化妝（如適用）、在陽光下暴曬。
- 7.3. 不可按摩、浸溫泉或熱敷注射部位。
- 7.4. 療程 24 小時內避免飲用酒精、或進食刺激性食物。
- 7.5. 療程後一星期內避免過分用力咀嚼，以防咀嚼肌活動過度（如適用）。

8. 備註

- 8.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄，如有查詢，請與你的醫生聯絡。

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署： _____

病人/ 家屬姓名： _____

日期： _____

