

醫療程序資訊 – 包皮環切術

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 包皮環切術是指切除覆蓋陰莖頭的包皮和黏膜組織的外科手術。
- 1.2. 在手術後，陰莖頭便不會再被包皮覆蓋。
- 1.3. 適應症：
 - 1.3.1. 包莖(包皮口過小/緊，令陰莖頭不能外露，影響陰莖血液循環)。
 - 1.3.2. 包莖嵌頓(包皮口緊束在陰莖頭上方的冠狀溝處，未能及時復位)。
 - 1.3.3. 復發性陰莖頭炎(包皮過長引致發炎，陰莖或包皮呈紅色，受感染部位有痛或癢的感覺或包皮下有呈異味的分泌膿物)。
 - 1.3.4. 包皮口過小/緊，難以排尿而容易導致血尿或泌尿道感染。

2. 檢查前之準備

- 2.1. 外科醫生會向您解釋有關手術的原因、過程及可能發生的併發症，並簽署手術同意書。
- 2.2. 麻醉科醫生會作出術前評估、解釋將施行之麻醉方法及有關風險，並簽署麻醉同意書。
- 2.3. 需要將手術部位的毛髮除去，並在手術前沐浴，注意陰莖清潔，以預防傷口感染。
- 2.4. 手術前 6 至 8 小時須禁飲食。

3. 程序

- 3.1. 手術會在全身麻醉下進行。
- 3.2. 醫生會切除適當長度的過長包皮。醫生會採用可吸收性縫線縫合傷口。

4. 手術後之復原

- 4.1. 您可能因為麻醉時因喉部插管而導致喉部輕微不適或疼痛及有痰。
- 4.2. 全身麻醉後，會感到疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
- 4.3. 排尿後，請保持傷口清潔乾爽。並用生理鹽水/ 消毒藥水/ 蒸餾水或冷開水沖洗，或用棉花球浸濕藥水，敷在傷口上數分鐘及抹乾。
- 4.4. 如傷口有大量出血，請即通知護士。
- 4.5. 通常傷口只用開口的紙杯覆蓋，避免衣服及被單磨擦。
- 4.6. 手術後可以洗澡，但不宜浸浴，傷口部位不可塗肥皂。
- 4.7. 手術後宜穿寬鬆衣物，切勿穿緊身褲，以免傷口受壓。
- 4.8. 傷口及附近組織會腫脹至少一周，屬正常現象。傷口約七至十天可以痊癒。
- 4.9. 請至少四週內避免性行為，直至傷口痊癒。

5. 可能出現風險及併發症

- 5.1. 手術期間
 - 5.1.1. 麻醉併發症。
 - 5.1.2. 近陰莖頭、尿道等器官出現損傷，或切除過多包皮。
- 5.2. 手術後初期
 - 5.2.1. 傷口感染。
 - 5.2.2. 傷口大量出血。
 - 5.2.3. 泌尿道感染。
 - 5.2.4. 結痂及分泌物滲出。

Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 – 包皮環切術

- 5.2.5. 急性尿貯積/小便滯留(因傷口疼痛而排尿不清)。
- 5.2.6. 傷口痛楚。
- 5.3. 手術後後期(罕見)
 - 5.3.1. 尿道口狹窄。
 - 5.3.2. 陰莖出現大面積疤痕。
 - 5.3.3. 陰莖彎曲。
 - 5.3.4. 勃起緊繃、疼痛。
 - 5.3.5. 心理及性心理障礙。

6. 備註

- 6.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

7. 參考資料

- 7.1. UpToDate. Neonatal circumcision: Risks and benefits.
- 7.2. UpToDate. Techniques for neonatal circumcision.

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署： _____

病人/ 家屬姓名： _____

日期： _____

