

醫療程序資訊 – 電灼及刮除手術

1. 電灼及刮除手術是什麼？

- 1.1. 電灼及刮除是一種皮膚手術，利用已經消毒的手術刮匙工具刮掉除皮膚患處，並以電灼外科手術儀器清除患處的組織及進行止血。
- 1.2. 當注射局部麻醉藥到皮膚患處時，您會感到短暫的疼痛。局部麻醉藥會使皮膚變得麻木，令您不會手術過程中感到疼痛。

2. 如何準備皮膚切片手術？

- 2.1. 請通知您的醫生，如您：
 - 2.1.1. 正在服用任何藥物
 - 2.1.2. 對藥物曾有過敏反應，特別是對局部麻醉藥物有過敏
 - 2.1.3. 曾出現任何凝血問題或正在服用如 warfarin 等抗凝血劑，或阿斯匹靈 Aspirin
 - 2.1.4. 可能或正在懷孕
 - 2.1.5. 體內有起搏器、心臟除顫器或其他醫療植入儀器
- 2.2. 在進行手術前，請按如常一樣服用你的常規藥物。手術前並不需要禁食。

3. 電灼及刮除手術有什麼風險？

- 3.1. 電灼及刮除手術主要風險有：
 - 3.1.1. 傷口疼痛，感染
 - 3.1.2. 傷口出血及附近部位瘀傷
 - 3.1.3. 傷口癒合不良
 - 3.1.4. 神經線受損
 - 3.1.5. 手術位置的皮膚顏色改變，顏色可較淺或較深，可能是永久性的
 - 3.1.6. 疤痕 (疤痕增生形成肉芽/癢痕，或凹陷的疤痕等)
 - 3.1.7. 其他：_____
- 3.2. 局部麻醉的主要風險有：
 - 3.2.1. 藥物過敏反應
 - 3.2.2. 治療/注射部位出現紅腫和痕癢
 - 3.2.3. 注射部位的疼痛，出血或感染
- 3.3. 本單張提供有關電灼及刮除手術的一般須知。各併發症的潛在風險可能因個別患者的健康狀況而異。以上提及的屬較常見的併發症，但並不代表全部風險。在罕有的情況下，可能發生未能預測的風險和併發症。如醫生認為有必要，可能進行額外的治療程序 / 手術 / 醫療檢查。
- 3.4. 手術後皮膚患處有機會復發，您可能需要額外的手術或配合其他治療才能達到最佳效果。
- 3.5. 請向您的醫生瞭解及查詢。

4. 電灼及刮除手術後

- 4.1. 醫護人員會提供手術後皮膚傷口的護理須知。手術後請保持傷口清潔乾爽，直至傷口完全癒合。傷口敷料請盡量保持完整，避免劇烈運動。請按照醫護人員建議進行清洗傷口的指示。
- 4.2. 當局部麻醉劑藥效於手術 1 - 2 小時後消失時，傷口可能會開始感到疼痛。如有需要，醫生會為您處方止痛藥。手術後幾天，傷口亦可能會感到疼痛或出現輕微滲血。
- 4.3. 如有以下情況，請聯繫本院：
 - 4.3.1. 傷口持續流血或有滲液（如果傷口持續流血，請用消毒紗布按住傷口，並通知本院）



Gleneagles Hospital
HONG KONG
港怡醫院

- 4.3.2. 傷口周圍的疼痛加劇或紅腫
- 4.3.3. 發燒
- 4.3.4. 有其他關於手術傷口的疑問

4.4. 手術傷口需要約 3 - 6 週癒合。疤痕最初會凸起及呈紅色，一般在數月內會有改善。

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/家屬簽署：_____

病人/家屬姓名：

日期：_____

