

醫療程序資訊 = 內窺鏡鼻竇手術

Hosp No. : HKID No.:

Case No. :

DOB : M/F

Adm Date : Contact No.:

Name

1. 簡介

- 1.1. 通過內窺鏡,去除鼻及鼻竇疾病,建立鼻竇引流。
- 1.2. 適用情況:
 - 1.2.1.鼻竇炎
 - 1.2.2.鼻瘜肉
 - 1.2.3.鼻或鼻竇腫瘤
 - 1.2.4.手術進道

2. 檢查前之準備

- 2.1. 有可能要接受術前檢查,包括電腦斷層掃描、血液測試、肺部 X 光及心電圖等。
- 2.2. 外科醫生會向您解釋有關手術的原因、過程和可能出現的併發症,並簽署手術同意書。
- 2.3. 麻醉科醫生會作出術前評估、解釋將施行之麻醉方法及有關風險。
- 2.4. 請告知醫生任何藥物過敏史、常規藥物治療或病況。
- 2.5. 須在手術前8小時禁飲食。

3. 程序

- 3.1. 進行此手術須全身麻醉,及在內窺鏡控制和監察下進行。
- 3.2. 疾病組織會被切除,正常結構則予保留。
- 3.3. 圖像顯示輔助。

4. 手術後之復原

- 4.1. 手術後兩邊鼻孔都會塞入鼻敷料,所以你可能要用口呼吸,敷料會於一至兩日後取走。
- 4.2. 取走敷料後可能有輕微出血,但通常都會自行止血。
- **4.3.** 敷料取去後,你可以出院回家。鼻水帶有小量血絲乃正常現象。你亦可能感到鼻塞。假如流血持續 不止,請前往最近的急症室求診。

5. 手術風險及併發症

- 5.1. 常見副作用和併發症 (≥1 風險%):
 - 5.1.1.鼻膜出血
 - 5.1.2. 咸染
 - 5.1.3.鼻腔粘連
 - 5.1.4. 復發
- 5.2. 不常見的嚴重風險或併發症 (<1%風險):
 - 5.2.1.損傷頸內動脈、籂前後動脈和蝶腭動脈,引致大出血
 - 5.2.2.眼損傷,包括眶周淤血、眼球血腫或膿腫、重影、失明
 - 5.2.3. 淚管損傷,引致流淚
 - 5.2.4.腦損傷,包括腦髓液鼻漏、腦膜炎、腦膿腫、腦氣腫
 - 5.2.5.粘液囊腫
 - 5.2.6.聲音改變
 - 5.2.7.暫時或永久失去嗅覺
 - 5.2.8.由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡



GENT-F05C-R2-02/25 Page 1 of 2

Hosp No. : HKID No.:

Case No. :

Name :

DOB : M/F

Adm Date : Contact No.:



醫療程序資訊 = 內窺鏡鼻竇手術

6. 手術後跟進

- 6.1. 請依期覆診。
- 6.2. 手術後兩邊鼻孔都會塞入鼻敷料,所以你可能要用口呼吸,敷料會於一至兩日後取走。
- 6.3. 取走敷料後可能有輕微出血,但通常都會自行止血。
- **6.4.** 敷料取去後,你可以出院回家。鼻水帶有小量血絲乃正常現象。你亦可能感到鼻塞。假如流血持續 不止,請前往最近的急症室求診。

7. 備註

7.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考,而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢,請與您的醫生聯絡。

8. 參考資料

8.1. Hospital Authority. Smart Patient Website.

本人明白以上關於手術或程序之資訊;本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問,並獲得充分的解答。

病人/家屬簽署:	
病人/家屬姓名:	
日期:	



Page 2 of 2 GENT-F05C-R2-02/25