

醫療程序資訊 - 局部麻醉

Hosp No. : HKID No.:

Case No. :

Name :

DOB : M/F

Adm Date : Contact No.:

1. 簡介

- 1.1. 局部麻醉是用來麻痺身體上一小部份範圍。它可用來防止或舒緩痛楚,但不會使人進入睡眠狀態。
- **1.2.** 一般而言,可用有多種方式施行局部麻醉,其中包括表面麻醉、浸潤麻醉、領域麻醉和週邊神經阻斷。可利用滴劑、噴霧、藥膏或注射麻醉藥物。

2. 檢查前之準備

- 2.1. 醫生會解釋麻醉過程及可能發生的併發症及簽麻醉同意書。
- 2.2. 程序前,請向醫生或負責護士出示所有常用的藥物與任何過敏記錄。
- 2.3. 程序前無須禁飲食。

3. 程序

- 3.1. 醫生或負責護士會解釋如何施行局部麻醉並替您施行局部麻醉。
- 3.2. 如須注射麻醉藥物,醫生會用酒精棉在手術位置上揉搓以進行消毒。
- 3.3. 注射麻醉藥一刻會感到痛楚,當麻醉藥產生作用時,會有局部麻痺的感覺,而痛楚會逐漸消失。

4. 能出現風險及併發症

- 4.1. 局部麻醉基本上是非常安全程序, 風險比起其他麻醉方式為低。
- 4.2. 當局部麻醉不足以控制疼痛,可能有須要轉用靜脈鎮靜或更高層級的麻醉。
- 4.3. 常見的副作用及風險包括:
 - **4.3.1.** 神經受損,通常是暫時性,一般經過數週到數個月就會復原。亦可能會造成身體局部持久的麻痺,但做成永久損壞的機會很微。
 - **4.3.2.** 血腫或積聚瘀血,如果您現時正在服用薄血藥或抗血小板藥,例如阿斯匹靈、可化凝、柏域斯等等,這情況下會比較容易造成有血腫。
 - 4.3.3. 局部麻醉失效,這可能需要注射更多麻醉藥或改用其他方式的麻醉
 - 4.3.4. 較少見的副作用及風險包括:
 - 4.3.5. 對麻醉藥敏感
 - 4.3.6. 發炎
 - 4.3.7. 周邊結構損害,例如血管、神經線、肌肉等。
- 4.4. 其他副作用極少發生,除非藥物用於超過建議的份量,例如:
 - 4.4.1. 痙攣
 - 4.4.2. 昏迷
 - 4.4.3. 呼吸衰弱
 - 4.4.4. 心律不正或停止。

5. 備註

5.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考,而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄,如有查詢,請與你的醫生聯絡。

6. 參考資料

6.1. Consent Information: Local Anesthetic for your procedure. Queensland Health, The State of Queensland.



GANA-F04C-R3-02/25 Page 1 of 2

Hosp No. : HKID No.:

Case No. :

Name :

DOB : M/F

Adm Date :

Contact No.:



醫療程序資訊 - 局部麻醉

本人明白以上關於手術或程序之資訊;本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問,並獲得充分的解答。

 病人/家屬簽署:
 病人/家屬姓名:
戸期:

