

醫療程序資訊 – 氟卡尼誘發測試

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 氟卡尼誘發測試是把一種能阻斷鈉通道的藥物「氟卡尼」注入病人體內以診斷病人是否患有魯格達氏症候群（Brugada Syndrome）。
- 1.2. 魯格達氏症候群是因心臟鈉通道變化而引起心跳異常加速，嚴重時會令病人失去知覺或突然死亡。
- 1.3. 一經診斷，可有針對性之治療。

2. 檢查前準備

- 2.1. 請依醫生指示是否需要停止藥物。
- 2.2. 檢查前 6 小時不可進食。
- 2.3. 我們會詳細向你和你的家人解釋是次檢查的好處、檢查過程及風險，而你需要簽署檢查同意書。
- 2.4. 我們會為你進行靜脈注射。
- 2.5. 我們會為你接駁心電圖機。

3. 檢查過程

- 3.1. 護士會定時幫你監察血壓、心律、呼吸率及心電圖。
- 3.2. 若你在過程中感到頭痛、胸痛、暈眩、呼吸急促、腸胃不適、口腔出現金屬味道、感到嘴唇周邊麻痺、複視或有任何不適，應立即通知醫護人員。
- 3.3. 若你在過程中，心電圖出現魯格達氏症候群一型、心室性心搏過速、心室纖維性顫動或 QRS 闊了，我們會停止檢查。
- 3.4. 檢查室設有足夠的醫療設備，以作不時急救之需要。
- 3.5. 整個程序需時約 60 分鐘來完成。
- 3.6. 報告會於即日完成，並由主診醫生詳細為你解釋測試結果。

4. 檢查後處理

- 4.1. 你需要休息至少 60 分鐘，得到你的醫生及醫護人員同意始可離開。

5. 可能出現的風險及併發症

- 5.1. 此檢查有一定的風險。
- 5.2. 注射藥物可引致心跳紊亂及突然死亡。

6. 備注

- 6.1. 若病人不接受此檢查，本單張不能盡錄所有可產生的後果。
- 6.2. 此項檢查可引致的危險或併發症亦未能盡錄，不可預計的併發症亦偶有發生。
- 6.3. 若有併發症發生，可能需要立即進行另一項緊急手術以作治療。
- 6.4. 如有查詢，請聯絡你的醫生或護士。
- 6.5. 以上所提供的醫療程序資料只供參考。如有查詢，請與你的醫生聯絡。

Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 -
氟卡尼誘發測試

7. 參考資料

- 7.1. Manoj N, George J, Simon M, et al. Advances in Arrhythmia and Electrophysiology, How to Perform and Interpret Provocative Testing for the Diagnosis of Brugada Syndrome, Long-QT Syndrome, and Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia. American Heart Association. 2011; 958-964.
- 7.2. 香港心臟電生理醫院聯會：遺傳性心律不齊。

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/家屬簽署：_____

病人/家屬姓名：_____

日期：_____

