

醫療程序資訊 – 肺動脈瓣擴張術

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No. :	

1. 簡介

- 1.1. 肺動脈瓣狹窄會影響血液流過肺動脈心瓣，若嚴重會導致心力衰竭或嚴重心律失常。肺動脈瓣擴張術（簡稱擴張術）利用經皮穿刺方法及X光導引，將特製的球囊經由血管進入心臟，把狹窄的心瓣口擴闊。

2. 手術的重要性

- 2.1. 擴張術是利用導管技術治療肺動脈瓣狹窄。並不是所有此類病人都適合此手術。在適合的病人當中，擴張術可提供一個很好的長期結果。若拒絕是項手術，病者可選擇外科手術或藥物治療。

3. 手術前的準備

- 3.1. 醫生會替你做心臟超聲波，以確定肺動脈瓣狹窄的程度。我們會特別留意你是否合適進行此項手術。
- 3.2. 我們會邀請你到門診或病房作術前準備工作，包括進行心電圖、肺部X光、抽血檢驗及超聲波心動圖。我們也會查詢你的過敏病歷。這些工作可在手術前幾天或在手術當天進行。
- 3.3. 醫生會詳細向你和你的親屬解釋是項手術的好處、施行過程及風險，而你需要簽署手術同意書。
- 3.4. 若你正服用薄血藥或二甲雙胍（一種糖尿藥，英文名稱 **metformin**），可能需要於手術前數天停藥。如有敏感病歷，你要服用類固醇。你亦可能服用抗生素以預防心瓣發炎。
- 3.5. 你需要禁食大約4-6小時；你亦可能需要靜脈輸液；如有需要，我們會在進行針刺的部位剃毛。
- 3.6. 若你是女性，請提供上次經期時間及避免手術前懷孕，因這項手術會涉及輻射，有機會影響胎兒。

4. 手術過程

- 4.1. 是項手術會在心導管中心內進行，通常只須局部麻醉。過程中你是清醒的，但為舒緩緊張情緒，醫生可能處方少量鎮靜劑。
- 4.2. 護士會在你胸口貼上電極以便監察心率及心跳，並為你戴上血氧量監察器。血壓量度器亦會不時從你的手臂量度血壓。
- 4.3. 醫生會在大腿內側（腹股溝）作刺針以便進入動脈或靜脈，然後在X光引導下將不同導管送入心臟。左右腳的血管也可能會用上。
- 4.4. 心臟內不同部位的壓力會被量度。醫生會注射顯影劑，並拍攝X光影片作為紀錄。
- 4.5. 醫生會將裝上球囊的特製導管會經過血管放到肺動脈瓣旁邊，然後打脹球囊擴闊肺動脈瓣。這個擴闊過程可能會重覆數遍。
- 4.6. 我們會量度心臟內壓力以衡量手術成功與否。

5. 手術後須知

- 5.1. 手術完成後，靜脈或動脈內的導管會被取出；傷口會被加壓止血。
- 5.2. 護士會定時替你量度血壓及脈搏，並檢查傷口。
- 5.3. 你需要臥床休息4小時，期間切勿移動或屈曲有傷口的大腿以防流血。如需咳嗽或打噴嚏，應事先用手輕按傷口位置，以避免出血。
- 5.4. 若你發現傷口滲血，應立即通知醫護人員。
- 5.5. 除特別指示外，你可以恢復進食及飲水。請多飲水以便將顯影劑從尿液排出。
- 5.6. 你要依指示服藥。

Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 – 肺動脈瓣擴張術

6. 手術後跟進

- 6.1. 一般情況下，你可以於手術後**1-3**天出院。
- 6.2. 出院前，醫護人員會檢查傷口，並蓋上消毒紗布。請保持傷口清潔，如消毒紗布被弄濕，請立即更換。一般情況下手術後第**3**天可淋浴。
- 6.3. 為防止傷口流血，在最初**3**天內應避免進行劇烈運動。傷口附近的瘀傷大多是輕微的，通常會在手術後**2至3**星期消失。如發現傷口有滲液流出、腫脹或發炎等問題，請立即返回醫院求醫，或到附近急症室就診。
- 6.4. 出院前醫生應已經向你解釋手術的結果。若有疑問，你與家人可於回院覆診時與醫生商討。

7. 手術風險或併發症

- 7.1. 此手術會有一定風險。
- 7.2. 因手術導致死亡或嚴重併發症的機會少於**5%**。(參考 1)
- 7.3. 很多病人會有輕微的肺動脈倒流，但絕大多數是極之輕微的。
- 7.4. 輕微併發症包括對顯影劑過敏，作嘔及腹股溝併發症等(**<5%**)。傷口附近的輕微瘀傷是普遍的。

8. 備註

- 8.1. 若病人不接受此項手術，本單張不能盡錄所有可產生後果。
- 8.2. 此項手術可引致的危險或併發症亦未盡錄，不可預計的併發症亦偶有發生。某類病人的風險亦較高。
- 8.3. 若有併發症發生，可能需要立即進行另一項緊急手術以作治療。
- 8.4. 如有查詢，請聯絡你的醫生或護士。

9. 參考

- 9.1. Kaul UA, Singh B, Tyagi S, Bhargava M, Arora R, Khalilullah M (1993). Long-term results after balloon pulmonary valvuloplasty in adults. Am Heart J. 1993 Nov; 126(5):1152-5.
- 9.2. Hospital Authority (2019). Smart Patient Website.

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署： _____

病人/ 家屬姓名： _____

日期： _____

