

|              |           |
|--------------|-----------|
| Hosp No. :   | HKID No.: |
| Case No. :   |           |
| Name :       |           |
| DOB :        | M / F     |
| Adm Date :   |           |
| Contact No.: |           |

## 醫療程序資訊 – 子宮頸電圈切除術手術

### 1. 簡介

- 1.1. 診斷：\_\_\_\_\_
- 1.2. 適應症：子宮頸高度鱗狀表皮病變 / 持續低度鱗狀表皮病變 / \_\_\_\_\_

### 2. 手術步驟

- 2.1. 手術前病者需要除掉身上所有金屬物件，例如手錶、耳環等
- 2.2. 先用陰道鏡檢查子宮頸及確定病變的位置
- 2.3. 局部麻醉 / 全身麻醉 / 監測麻醉
- 2.4. 以一柄通電的電圈手術刀切除子宮頸移行區
- 2.5. 用球狀電燒器+/- 止血藥水止血
- 2.6. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理部或依慣常程序處理
- 2.7. 手術期間可能會拍照或/和錄影以供教學/研究用途(如有反對,請向醫護人員提出)

### 3. 預期得到的效果

- 3.1. 診斷及治療

### 4. 其他的影響

- 4.1. 手術後二至三週內或會有陰道出血及輕微腹痛現象

### 5. 重要風險及併發症(未能盡錄)

- 5.1. 肥胖、病情嚴重、曾進行過手術或有其他疾病者必須明白手術引致嚴重或常見併發症的風險將會增加
- 5.2. 麻醉併發症
- 5.3. 嚴重:
  - 5.3.1. 損傷附近器官例如膀胱,腸道(不普遍)
  - 5.3.2. 電燒灼傷正常組織(不普遍)
  - 5.3.3. 可能增加早產、低體重兒、胎膜早破的機會；但未證實會增加新生兒罹病率
  - 5.3.4. 子宮頸病變復發(達十分之一，普遍)
  - 5.3.5. 次發性出血(百分之一到二，普遍)
  - 5.3.6. 宮頸狹窄(百分之一到二，普遍)
- 5.4. 常見:
  - 5.4.1. 流血
  - 5.4.2. 發炎(百分之一到三，普遍)

### 6. 不接受手術的風險

- 6.1. 病變持續，甚至進展為子宮頸癌

### 7. 其他治療方法

- 7.1. 椎形切除術
- 7.2. 其他

