

医疗程序资讯 -剖腹产后阴道分娩

Hosp No. : HKID No.:

Case No. :

DOB : M/F

Adm Date : Contact No.:

大多数曾有一次剖腹产史的妇女可以尝试经阴道正常分娩 (VBAC)。因此您可以选择尝试阴道分娩或者再度接受剖腹产手术。 当然,剖腹产后阴道分娩与再度剖腹产均有风险。 您的选择是很重要而且会被尊重。 分娩计划将由您和产科医生一起决定。 请您在与产科医生讨论之前先阅读这份数据。

1. 甚么是剖腹产后阴道分娩?

1.1. 就是在剖腹产之后的妊娠尝试阴道分娩。 现代产科中剖腹产的切口绝大多数是位于子宫下段。 这是在分娩时子宫不收缩的一部份,再次妊娠时子宫疤痕破裂的机会比较低。但是在怀孕期,有愈合疤痕的子宫不像正常无疤痕的子宫那样坚韧,所以子宫疤痕破裂的风险便增加了。

2. 剖腹产后阴道分娩的好处和风险是甚么?

- 2.1. 通常, 剖腹产后阴道分娩与再度剖腹产相比可缩短母亲的住院时间, 减少出血、感染、发烧以及血管栓塞的机会。 如果没有特别问题, 我们会支持您选择阴道分娩。 假如阴道分娩成功, 这会是最安全的方法。 而且新生儿经历了分娩过程后呼吸也会比再度剖腹产分娩好。
- 2.2. 另外,您需要明白:
 - 2.2.1. 子宫疤痕破裂是很罕见的并发症。剖腹产后阴道分娩的子宫疤痕破裂机会稍增至每10,000 名产 妇中22-74 人,而再度剖腹产妇女子宫疤痕破裂机会近乎零。换言之,再度剖腹产稍降低了 子宫疤痕破裂的机会。
 - 2.2.2. 催生会令子宫疤痕破裂的机会增加 2-3 倍,详情您的产科医生可与您再商讨。
 - 2.2.3. 若罕见的子宫疤痕破裂发生,胎儿并发症风险会增加。
 - **2.2.4.** 剖腹产后阴道分娩的围生期胎儿死亡率 (每10,000名婴儿中4人) 比再度剖腹产高,但与首次分娩产妇相若。
 - 2.2.5. 婴儿脑瘫的风险在阴道分娩与计划剖腹产相比尚未完全确定。

3. 阴道分娩成功的机会是多少?

3.1. 绝大多数已发表的研究指剖腹产后阴道分娩中 **72-75%**可以成功分娩。 如需要催生,成功阴道分娩 的机会较低。但现时我们没有可靠的方法预测个人能否成功分娩。如有阴道分娩史的妇女成功机会 高达九成。

4. 分娩过程中,您会得到怎样的照顾?

- 4.1. 产程早期就会开始手术前的准备,包括禁食,静脉注射及配血试验以预备有输血的可能。 整个分娩 过程会有持续的电子胎心监护。 我们会密切关注您的血压、脉搏和产程进展。 如果产程进展不理想
 - ,胎心不正常或有其他问题,可以随时安排剖腹产手术。分娩过程中的镇痛方法与正常的分娩相同
 - ,您可以选择硬膜外麻醉,您亦可以由丈夫或其他家属陪伴分娩。 分娩过程一般不会太长及艰难。

5. 如果剖腹产后阴道分娩失败会怎样?

5.1. 您需要接受紧急剖腹产手术。



GOBG-F27S-R3-02/25 Page 1 of 2

Hosp No. : HKID No.:

Case No. :

Name :

DOB : M/F

Adm Date : Contact No.:



医疗程序信息 剖腹产后阴道分娩

6. 选择再度剖腹产手术的风险和好处是甚么?

).	<u> </u>
	6.1. 选择再度剖腹产手术会有较高手术并发症的风险,包括器官的损伤 (例如膀胱,输尿管及肠道)、出血及伤口并发症等。 将来发生前置胎盘和胎盘黏连的机会增加。 选择性剖腹产的病率及死亡率总体低于急症手术,但仍高于正常阴道分娩。
Z	本人明白以上关于手术或程序之资讯;本人亦有机会对病情及治疗方案提出疑问,并获得充分的解答。
	病人/家属签署:

病人/家屬姓名:_____

日期: _____



Page 2 of 2 GOBG-F27S-R3-02/25