

醫療程序資訊 - 趾甲內生症 (嵌甲)

Hosp No. : HKID No.:

Case No. : Name :

DOB : M/F

Adm Date : Contact No.:

1. 簡介

- 1.1. 趾甲內生症多見於腳趾。
- 1.2. 趾甲內生症是指甲旁軟組織擠到趾甲上,使趾甲嵌入軟組織,並可穿破組織引致感染。
- 1.3. 造成趾甲内生的原因很多,主要因剪腳甲不當或鞋頭太小太緊,令腳趾受擠壓。
- 1.4. 部份病例和灰甲有關。

2. 手術前之準備

- 2.1. 有可能需接受術前檢查包括:受影響部位照 X 光、血液測試、肺部 X 光及心電圖等。
- 2.2. 外科醫生會向您解釋有關手術的原因、過程和可能出現的併發症,並簽署手術同意書。
- 2.3. 請告知醫生任何藥物過敏史、常規藥物治療或病況。
- 2.4. 請告知醫生如有服用任何薄血藥物。

3. 程序

- 3.1. 進行此手術須使用局部麻醉。
- 3.2. 外科醫生會在足趾甲作切口。
- 3.3. 然後切除患處約三分之一的趾甲。
- 3.4. 趾甲根部組織及發炎組織須完整切除。

4. 手術後之復原

- 4.1. 術後鼓勵把手術部位抬高。
- 4.2. 術後須洗傷口直至痊癒。
- 4.3. 請保持傷口乾爽及清潔,以避免傷口感染。
- 4.4. 如傷口疼痛,可告知護士,護士會按醫囑給予止痛藥。
- 4.5. 應依照醫生處方按時服藥,並於預定的日期覆診。

5. 可能出現風險及併發症

- **5.1.** 一般手術都可能發生的併發症包括麻醉相關的風險、感染、神經線或血管受損、出血或血塊及癒合不良等。
- 5.2. 趾甲變形及復發。

6. 備註

6.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考,而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢,請與您的醫生聯絡。

7. 參考資料

- 7.1. Hospital Authority. Orthopaedic Website.
- 7.2. Retrieved from Better Medicine, Dematology Website.



GORT-F13C-R2-02/25 Page 1 of 2

Hosp No. : HKID No.:

Case No. :

Name :

DOB : M/F

Adm Date :

Contact No.:



醫療程序資訊 - 趾甲內生症 (嵌甲)

本人明白以上關於手術或程序之資訊;本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問,並獲得充分的解答。



Page 2 of 2 GORT-F13C-R2-02/25