

醫療程序資訊 - 二氧化碳激光治療

1. 二氧化碳激光治療是什麼?

二氧化碳激光治療利用特定波長的激光從以破壞皮膚患處異常的組織。此治療需要外用麻醉藥物或局部麻醉。當注射局部麻醉藥時，注射部位會感到短暫的刺痛。麻醉藥可減輕激光治療期間的不適或疼痛。

2. 程序前須知

請通知你的醫生，如你：

- 正在服用任何藥物或中藥
- 對藥物曾有過敏反應，特別是對局部麻醉藥物有過敏
- 曾出現任何凝血問題或正在服用抗凝血劑 (如華法林，或阿斯匹靈等)
- 可能或正在懷孕
- 體內有起搏器、心臟除顫器或其他醫療植入儀器
- 曾接受任何醫學美容治療
- 患有唇瘡（單純性疱疹）感染
- 曾患有白斑或白蝕症或皮膚過敏

陽光可令色素增加，引致皮膚治療位置反黑，所以激光治療前和治療後請進行防曬。

3. 可能的風險及併發症

- 疼痛
- 紅腫
- 傷口出血及附近部位瘀傷
- 痕癢
- 水泡
- 感染
- 復發
- 結硬皮
- 疤痕 (疤痕增生形成肉芽或癍痕或凹陷的疤痕等)
- 傷口癒合問題
- 炎症後色素沉著過度
- 皮膚質感變化
- 唇瘡 (單純性疱疹) 復發機會增加



Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 - 二氧化碳激光治療

4. 程序後須知

- 治療區域在幾天內可能會出現發紅、腫脹、瘙癢、疼痛或不適。傷口痊癒的所需時間視乎治療的部位和深度，一般需要約 **7-14** 天。
- 傷口完全癒合前，請保持傷口整潔。請遵循醫護人員的傷口護理指示。避免抓撓或擦洗傷口。
- 在此期間，請進行防曬和避免曬太陽，以減少色素沉著過度。請塗抹防曬霜或使用物理防曬方法。
- 應避免游泳及多流汗的活動等，直至傷口完全癒合。
- 如有以下情況，請聯繫本院：
 - 傷口持續流血或有滲液。
 - 傷口周圍的疼痛加劇或紅腫
 - 發燒
 - 有其他關於手術傷口的疑問

5. 備註

以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄，如有查詢，請與我們的醫生聯絡。

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署： _____

病人/ 家屬姓名： _____

日期： _____

