

醫療程序資訊 – 經尿道前列腺切除手術

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No. :	

1. 簡介

- 1.1. 良性前列腺增生症（亦稱良性前列腺脹大），是男性泌尿科最常見的疾病，經尿道前列腺切除手術是治療這種病的標準治療法。

2. 手術步驟

- 2.1. 使用內視鏡通過尿道並進行電切，無腹部切口，在全身麻醉或脊髓麻醉下進行。手術過程中，用沖洗液提供良好的視像切除腫大前列腺。止血後，前列腺增生組織將被吸出，再將一個導管經尿道進入膀胱排尿和沖洗膀胱。

3. 手術前預備

- 3.1. 手術前一般至少 6-8 小時（或按照醫生指示的時間）開始禁飲食。
3.2. 醫生會告知你禁食期間是否繼續服用常規藥物和其他指示。
3.3. 請告知醫生任何醫療狀況（例如：糖尿病、心臟病、高血壓）及任何正服用的藥物。
3.4. 按醫囑停用阿斯匹靈或薄血藥。

4. 可能發生之危險或併發症

- 4.1. 心血管系統併發症：心肌梗塞、心肌缺氧、中風、靜脈栓塞、肺栓塞等。
4.2. 呼吸肺部膨脹不全、肺炎、哮喘發作、慢性阻性氣管病發作。
4.3. 過敏及反應性休克。
4.4. 與手術有關之併發症（16%）。
 4.4.1 損傷附近器官包括膀胱穿孔或尿道受損（少於 1%）。
 4.4.2 尿道發炎（15%）。
 4.4.3 傷口出血（5%）。
 4.4.4 血塊停滯於膀胱內（1-2%）。
 4.4.5 經尿道切除前列腺徵候群（少於 1%）。
 4.4.6 除下管後不能小便（3.6-11%）。
 4.4.7 逆行射精（68%）。
 4.4.8 勃起功能障礙（15.7%）。
 4.4.9 尿道狹窄（5%）。
 4.4.10 小便失禁（0.8%）。
 4.4.11 死亡率（0.5%）。

5. 手術後情況

- 5.1. 手術後需臥床休息。
5.2. 膀胱插有導尿管以作沖洗之用，當尿液回復正常，尿管便可除下。
5.3. 手術後尿道刺痛及有小量血尿是常見現象，只要盡量多飲清水及服用止痛藥，便可減輕小便刺痛。
5.4. 手術後小便可能會頻密或有輕微血尿，這些都是正常。

6. 手術後跟進

- 6.1. 按醫囑飲用 6-10 杯液體。
6.2. 多吃高纖維食物，防止便秘。

Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 – 經尿道前列腺切除手術

- 6.3. 至少 6 星期不要做劇烈運動。
- 6.4. 避免性交至少 4-6 星期。
- 6.5. 繼續服用一切處方藥，但和你的醫生商討何時服用阿司匹林或血液稀釋劑。

7. 備註

- 7.1. 本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。

8. 參考資料

- 8.1. Hospital Authority. Smart Patient Website.

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署： _____

病人/ 家屬姓名： _____

日期： _____

