

醫療程序資訊 – 副睪丸水腫囊切除手術

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 副睪丸腫囊是指有液態腫囊, 位置在睪丸旁邊的副睪丸中。
- 1.2. 此腫囊是很常見, 如果腫囊很小或沒有明顯的症狀, 可能不需要治療。
- 1.3. 如腫囊尺寸增加, 會引起不適或疼痛, 則需要做手術。
- 1.4. 手術會有可能影響生育能力。

2. 手術前準備

- 2.1. 簽署手術同意書, 獲得書面同意是必要的。
- 2.2. 在手術前, 病人需要禁飲食六至八小時或按醫囑指示。

3. 手術過程

- 3.1. 此手術通常需要全身麻醉或中樞神經軸麻醉下進行。
- 3.2. 先在陰囊切一個小開口, 將囊腫與睪丸及副睪丸分開, 然後取出囊腫。
- 3.3. 最後用手術專用線, 縫合陰囊上切口。

4. 風險及併發症

- 4.1. 手術相關併發症:
 - 4.1.1. 常見的併發症是術後幾天有陰囊腫脹或自傷口的淡黃色液體滲出。
 - 4.1.2. 偶然的併發症是囊腫復發, 血腫(可自行慢慢吸收或需要手術切除), 慢性睪丸疼痛, 傷口感染。
 - 4.1.3. 有可能的併發症, 影響生育能力。

5. 備註

- 5.1. 本單張僅供參考, 並無盡錄所有併發症。其他未能預見的併發症均有可能發生。某些類別病人面對的實際風險可能有所不同。如欲索取更多資料, 請與你的醫生聯絡。

6. 參考資料

- 6.1. The British Association of Urological Surgeons Website.

本人明白以上關於手術或程序之資訊; 本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問, 並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署: _____

病人/ 家屬姓名: _____

日期: _____