


## 醫療程序資訊 – 輸精結紮術

|               |           |
|---------------|-----------|
| Hosp No. :    | HKID No.: |
| Case No. :    |           |
| Name :        |           |
| DOB :         | M / F     |
| Adm Date :    |           |
| Contact No. : |           |

### 1. 簡介

- 1.1. 輸精管結紮術一種以永久避孕為目的的外科手術。手術將輸精管結紮以阻止精子由睪丸經至陰莖。
- 1.2. 此手術不會影響性慾及性功能。但手術後並非即時避孕，因為有部分精子已經過輸精管結紮位置。一般要經過 20 次射精才能排淨。所以在醫生確定精液完全沒有精子之前，短期內仍需要採用其他避孕方法。



(截圖自香港家庭計劃指導會網頁醫療程序資訊輸精管切除)

### 2. 手術前準備

- 2.1. 簽署手術同意書，需獲得書面同意。
- 2.2. 如需麻醉術前，病人需要禁飲食六小時。
- 2.3. 請告知醫生任何醫療狀況（例如：糖尿病、心臟病、高血壓）及任何正服用的藥物，因為有些藥物如阿斯匹靈或薄血藥等有可能需要停服。

### 3. 手術過程

- 3.1. 手術可在每邊的陰囊開小切口，切斷輸精管及切除一小段輸精管，把輸精管的末端結紮或封閉，以縫線縫合傷口。

### 4. 可能出現風險和併發症

- 4.1. 輕微陰囊瘀傷及腫脹
  - 4.2. 術後頭幾次射精，精液內有血絲
  - 4.3. 輕微睪丸疼痛或不適
  - 4.4. 睪丸發炎徵狀
- 以上所列的併發症不能盡錄及罕見併發症未有列出。

### 5. 手術後

- 5.1. 手術後幾天應避免提取重物及進行劇烈運動。
- 5.2. 如傷口部位的痛楚、紅腫、滲膿、大量出血、發熱或有任何發炎跡象等，請即聯絡主診醫生接受診治。

### 6. 備註

- 6.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄，如有查詢，請與你的醫生聯絡。

