

醫療程序資訊 – 陰囊探查術

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 通過陰囊手術切口進行的探索。
- 1.2. 解開受扭曲影響的睪丸，用縫合修復術固定陰囊中的兩個睪丸，以防止進一步扭曲。
- 1.3. 如果扭曲時間過長而導致嚴重受損或壞死的睪丸，或需要將其切除。


2. 手術前預備

- 2.1. 簽署手術同意書，獲得書面同意是必要的。
- 2.2. 在手術前，病人需要禁飲食六至八小時或按醫囑指示。
- 2.3. 請告知醫生任何醫療情況（例如：糖尿病，心臟病，高血壓）及任何正服用的藥物。

3. 手術步驟

- 3.1. 此手術通常需要全身麻醉下進行
- 3.2. 陰囊前面切一個小開口，檢查兩個睪丸。
- 3.3. 如果確認睪丸受扭曲，便將扭曲的睪丸解開。
- 3.4. 如果睪丸在解開後保持健康和活力，將用不可吸收的縫合將其固定在陰囊中，以防止進一步扭曲。
- 3.5. 小部分的病人有延遲診斷，令到睪丸嚴重受損，可能需要全個移除。
- 3.6. 另外還會固定另一則沒有受扭曲影響的睪丸，以防止將來受到扭曲的可能。
- 3.7. 手術專用線會在兩至三星期溶化。

Torsion



© 2014 The Children's Hospital of Philadelphia



Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 – 陰囊探查術

4. 可能發生之危險或併發症

- 4.1. 術後幾天陰囊會有腫脹和瘀傷。
- 4.2. 如果已經壞死的睪丸，可能需要將其切除。
- 4.3. 睪丸周圍的血腫，可能需要時間來自行緩解或手術引流。
- 4.4. 傷口感染需要抗生素或手術引流。
- 4.5. 睪丸萎縮
- 4.6. 由於扭曲受影響的睪丸，造成中斷血液供應，令到睪丸損傷，以致生育率下降
- 4.7. 以上所列的併發症不能盡錄及罕見併發症未有列出。

5. 備註

- 5.1. 本單張僅供參考，並無盡錄所有併發症。其他未能預見的併發症均有可能發生。某些類別病人面對的實際風險可能有所不同。如欲索取更多資料，請與你的醫生聯絡。

6. 參考資料

- 6.1. The British Association of Urological Surgeons (BAUS) Website.

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署： _____

病人/ 家屬姓名： _____

日期： _____

