

醫療程序資訊 – 睪丸未降 (成年人)

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 睪丸未降或隱睪，是指睪丸未能下降至陰囊。通常出現在兒童身上，但亦有成年人被診斷患有此情況。
- 1.2. 醫生會為病人進行腹部及生殖器部位進行臨床檢查，若有懷疑，可能會利用超聲波或電腦斷層掃描等影像測試，來確定睪丸的位置和狀況。
- 1.3. 此外，醫生亦可能會安排進行精液分析，以作出生育能力評估。
- 1.4. 治療方法視乎年齡及睪丸未降的性質而定，其中包括睪丸固定術、腹腔鏡探查手術或睪丸切除手術。

2. 手術前準備

- 2.1. 簽署手術同意書，獲得書面同意是必要的。
- 2.2. 在手術前，病人需要禁飲食六至八小時或按醫囑指示。
- 2.3. 請告知醫生任何醫療狀況 (例如：糖尿病、心臟病、高血壓) 及任何正服用的藥物。

3. 手術過程

- 3.1. 腹股溝睪丸固定手術：
 - 3.1.1. 在腹股溝部位開一個小切口，並進入腹股溝管。
 - 3.1.2. 仔細將睪丸、輸精管和睪丸血管與附近的組織分離。
 - 3.1.3. 將相關的未閉合腹膜鞘狀突閉合。
 - 3.1.4. 在陰囊另開一個小切口，形成肉膜窩，將睪丸送進並固定在內。
 - 3.1.5. 以可吸收性縫合線將傷口逐層縫上。
- 3.2. 腹腔鏡探查手術：
 - 3.2.1. 在腹部位開三至四個小切口，並放入腹腔鏡及微創用具。
 - 3.2.2. 仔細尋找及檢查睪丸、輸精管和睪丸血管狀況和長度，與附近的組織分離。
 - 3.2.3. 醫生會按腹腔鏡之探查狀況決定進行睪丸切除術、睪丸固定手術，或是分階段進行睪丸固定手術。
 - 3.2.4. 以可吸收性縫合線將微創傷口縫合。
- 3.3. 睪丸切除手術 (適用於萎縮睪丸或懷疑有癌變)：
 - 3.3.1. 手術過程 (開放式)
 - 3.3.1.1. 在腹股溝部位或陰囊開一個小切口
 - 3.3.1.2. 將精索內的血管和輸精管結紮，然後將睪丸取出
 - 3.3.1.3. 以可吸收性縫合線將傷口逐層縫上
 - 3.3.2. 手術過程 (腹腔鏡)
 - 3.3.2.1. 若在腹腔鏡探查手術時發現睪丸已退化或萎縮，失去其功能，醫生會將精索內的血管和輸精管結紮，然後將睪丸取出

4. 風險及併發症

- 4.1. 出血
- 4.2. 感染
- 4.3. 傷口疼痛
- 4.4. 睪丸血管受到損傷，導致睪丸萎縮

