

醫療程序資訊 – 經尿道前列腺水蒸氣療法

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No. :	

1. 簡介


- 1.1. 良性前列腺增生是一種常見泌尿系統疾病，其特徵是前列腺體積逐漸增大。它是一種年齡衰老的疾病，引至膀胱出口阻塞，導致下尿道症狀，這是嚴重影響病者的生活質素。
- 1.2. 經尿道前列腺水蒸氣療法是一個微創治療，一種使用熱能去治療良性前列腺增生的替代選擇。

2. 適應症

- 2.1. 經尿道前列腺水蒸氣療法是一種治療 50 歲或以上的病人，其前列腺的體積是大過 30 公克及細過 80 公克。

3. 手術程序

- 3.1. 水蒸氣療法是一個微創治療，在監察麻醉或局部麻醉下進行。
- 3.2. 它是一種新技術，利用有針對性的受控水蒸汽氣能量來製造前列腺壞死的組織。



4. 手術前之預備

- 4.1. 病人按醫生建議，手術前 6-8 小時禁飲食。
- 4.2. 外科醫生討論及解釋手術詳情，之後才簽署手術同意書。
- 4.3. 請告知醫生如有任何疾病如糖尿病、心臟病、血壓高，需要長期服藥，請告知醫生。
- 4.4. 請跟隨醫生建議停用抗凝血藥如保栓通、亞士匹靈。
- 4.5. 你的醫生會在手術前處方一劑針劑抗生素以防感染。

5. 潛在的併發症

普遍：

- 5.1. 血尿
- 5.2. 精液有血
- 5.3. 小便痛

具體：

- 5.4 尿道炎
- 5.5 副睪發炎
- 5.6 尿頻
- 5.7 尿儲留



Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 – 經尿道前列腺水蒸氣療法

6. 手術後護理

- 6.1. **飲食**：手術後數小時可以進食，如病人未能進食便可能需要進行靜脈滴注，手術後天，請多喝水以令腎臟排清廢物。
- 6.2. **導尿管**：病人須在手術後 5-7 天使用導尿管。導尿管是經由尿道進入膀胱，病人需要出院後將尿管帶回家，病人出院前需要學習護理導尿管。
- 6.3. **傷口痛楚控制**：手術頭數天病人感到不適或痛楚是正常。病人在手術後可服用口服止痛藥，肌肉注射或靜脈注射止痛藥去控制痛楚。
- 6.4. **藥物**：病人於出院時，醫生處方止痛藥去緩解尿道不適。
- 6.5. **行動**：在手術後，建議病人多起床走動，頭數星期不要進行劇烈運動。

7. 覆診

- 7.1. 如手術後情況許可，病人可安排出院，然後按時覆診。如果病人出現併發症，須立即聯絡泌尿科醫生到就近急症室求診。

8. 備註

- 8.1. 本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。某類病人的風險程度亦為不同程度。如有查詢，請聯絡泌尿科醫生。

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署： _____

病人/ 家屬姓名： _____

日期： _____

