

醫療程序資訊 – 經尿道膀胱碎石術

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 膀胱石是當尿液未能完全排空時，會在膀胱內形成堅硬的礦物質塊。
- 1.2. 膀胱石主要影響 50 歲或以上的患者，特別是男性，因為他們患有良性前列腺增生而導致不正常尿速，引致尿儲留。

2. 適應症

- 2.1. 膀胱碎石術是用來治療膀胱石。

3. 手術程序

- 3.1. 經尿道膀胱碎石術是在全身麻醉下進行。
- 3.2. 膀胱鏡經由尿道放進膀胱。
- 3.3. 膀胱石用激光打成小碎石，細小的膀胱碎石被灌洗，及在膀胱內去除。
- 3.4. 手術後，導尿管放進膀胱，確保正常排尿。

4. 手術前之預備

- 4.1. 病人按醫生建議，手術前 6-8 小時禁飲食。
- 4.2. 外科醫生討論及解釋手術詳情，之後才簽署手術同意書。
- 4.3. 請告知醫生你已懷孕。
- 4.4. 請告知醫生如有任何疾病如糖尿病、心臟病、血壓高，需要長期服藥，請告知醫生。
- 4.5. 請跟隨醫生建議五天前停服抗凝血藥如保栓通、亞士匹靈。
- 4.6. 你的醫生會在手術前處方一劑針劑抗生素以防感染。

5. 潛在的併發症

普遍：

- 5.1. 血尿
- 5.2. 尿道炎
- 5.3. 小便痛

具體：

- 5.4. 尿道損傷
- 5.5. 尿道收窄
- 5.6. 膀胱痙攣

罕見：

- 5.7. 膀胱刺穿

6. 手術後護理

- 6.1. **飲食：**手術後數小時可以進食，如病人未能進食便可能需要進行靜脈滴注，以維持身體營養和水份。
- 6.2. **導尿管：**病人須在手術後 2-3 天使用導尿管。導尿管是經由尿道進入膀胱，導尿管會在出院時拔除。
- 6.3. **傷口痛楚控制：**手術頭數天病人感到不適或痛楚是正常。病人在手術後可服用口服止痛藥，肌肉注射或靜脈注射止痛藥去控制痛楚。



Gleneagles Hospital
HONG KONG
港怡醫院