

醫療程序資訊 – UroLift 植入術


Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 良性前列腺增生是男性泌尿科最常見的疾病。他們需要服用藥物，但藥物有時不能足夠緩解症狀，並可能導致一些副作用。例如：頭暈，乏力和性功能障礙。
- 1.2. 藥物不需要成為終身負擔，也不需要等到需要手術才能解決問題。通過 UroLift 植入術，患有良性前列腺增生的男士可以避免傳統手術。

2. 手術過程

- 2.1. 一般使用半身麻醉進行或監察麻醉。
- 2.2. 簡單的 UroLift 植入術裝置通過阻塞的尿道，到達增生前列腺。
- 2.3. 微型的 UroLift 植入物置入，以打開增生的前列腺並保持尿道暢通。
- 2.4. UroLift 系統治療通過打開阻塞的尿道，從而提供快速可靠的症狀緩解。
- 2.5. 性功能不受影響。



3. 風險及併發症

- 3.1. 麻醉相關的併發症
- 3.2. 尿頻
- 3.3. 排尿時輕度灼熱
- 3.4. 少量血尿
- 3.5. 尿道炎
- 3.6. 尿道狹窄

4. 手術前護理

- 4.1. 手術前一般至少 6-8 小時（或按照醫生指示的時間）開始禁飲食。
- 4.2. 請告知醫生任何醫療狀況（例如：糖尿病、心臟病、高血壓）及任何正服用的藥物。
- 4.3. 按醫囑停用抗凝血藥如阿斯匹靈或薄血藥

5. 手術後護理

- 5.1. 每天至少喝 2 公升水。
- 5.2. 最少 1 星期內不可劇烈運動。
- 5.3. 如有發燒，過多血尿，睪丸或陰囊疼痛，腫脹或無法排尿，請到急症室就診。
- 5.4. 持續服用所有處方藥物，但服食抗凝血藥如亞士匹靈或薄血藥前應先諮詢醫生。
- 5.5. 最少 2 星期內避免食用刺激性食物



Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 – UroLift 植入術

6. 跟進覆診

- 6.1. 在出院後，請遵循跟進覆診的指示。
- 6.2. 如出院後出現任何嚴重的事件，請聯絡主診醫生或到急診室求診。

7. 備註

- 7.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄，如有查詢，請與你的醫生聯絡。

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署： _____

病人/ 家屬姓名： _____

日期： _____

