

醫療程序資訊 – 加衛苗 9 疫苗接種

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

請你在決定自己或你的未成年子女是否會接種加衛苗 9 - 子宮頸癌預防疫苗前(以下簡稱“疫苗”)，詳細閱讀以下資料：

1. 疫苗的主要用途

- 1.1. 子宮頸癌主要由人類乳頭瘤狀病毒(HPV)感染引致。加衛苗 9 疫苗能夠對抗由HPV6、11、16、18、31、33、45、52及58型病毒所引發的HPV生殖器官濕疣(椰菜花)、子宮頸癌、外陰癌、陰道癌和肛門癌。

2. 哪些人適宜接種加衛苗 9？

- 2.1. 疫苗屬預防性質，應在未接觸過 HPV 16、18、31、33、45、52 及 58 型病毒前注射。換言之，最好在未開始性行為前接種。若在未開始性行為時接種，疫苗可減低患子宮頸癌的風險最高達 70%-90%。對於已有性經驗的女性，疫苗的效用會因人而異，未必能達 70%-90%。疫苗不能治療現存的癌前病變或子宮頸癌。

3. 加衛苗 9 的接種時間

- 3.1. **15 歲或以上**：加衛苗 9 應於 6 個月內分 3 次施打，注射第 1 針疫苗後 2 個月施打第 2 針，第 3 針則於注射第 2 針疫苗後 4 個月施打。
- 3.2. **9 至 14 歲**：加衛苗 9 應分 2 次施打，注射第 1 針疫苗後 5 至 13 個月施打第 2 針。

4. 哪些人不適宜接種加衛苗 9？

- 4.1. 對先前施打的加衛苗 9 或加衛苗 過敏
- 4.2. 對酵母菌過敏(嚴重過敏反應)
- 4.3. 對非晶形羥基磷酸鋁硫酸鹽過敏
- 4.4. 對聚山梨醇酯 80 過敏
- 4.5. 有血小板低或血凝固問題
- 4.6. 免疫系統衰弱，例如先天性免疫力缺乏症或愛滋病毒(HIV)感染

5. 誰應延遲接受疫苗？

- 5.1. 證實懷孕、計劃在未來九個月內懷孕或可能現已懷孕；
- 5.2. 若正服用或計劃服用任何藥物，包括成藥者，請告知醫生；
- 5.3. 現正因病而出現發燒(100° F / 37.8°C或以上)。

6. 疫苗之副作用

- 6.1. 最常見的副作用：注射部位疼痛、腫脹、發紅、發癢、瘀青、出血、以及出現硬塊、頭痛、發燒、噁心、暈眩、疲倦、腹瀉、腹痛、喉嚨痛。
- 6.2. 不常見的副作用：腺體腫脹(頸部、腋窩或腹股溝)、關節疼痛、異常疲倦、虛弱或意識混亂、發冷、全身不適、腿部疼痛、呼吸短促、胸痛、肌肉疼痛、肌肉虛弱、癲癇發作、劇烈胃痛、較平常容易出血或瘀傷、皮膚感染、暈厥。

Hosp No. : HKID No.:
Case No. :
Name :
DOB : M / F
Adm Date :
Contact No.:

醫療程序資訊 – 加衛苗 9 疫苗接種

7. 疫苗之風險

- 7.1. 藥物過敏：藥物過敏的徵兆：呼吸困難、氣喘(支氣管痙攣)、蕁麻疹、皮疹。
- 7.2. 如有疑問，請向你的醫生查詢。

8. 接種疫苗後之注意事項

- 8.1. 接種後，請在診所休息約15分鐘才離開。
- 8.2. 接種疫苗期間至完成後的三個月內，必須採取有效避孕措施。倘若你在此期間証實懷孕，請馬上通知醫護人員。
- 8.3. 如計劃懷孕，可於最後一次疫苗注射完畢後的三個月開始。
- 8.4. 疫苗計劃開始後，在任何情況下，所有費用，恕不接受退款。

9. 接種 HPV 疫苗後，我仍需要接受子宮頸癌篩查嗎？

- 9.1. 接受疫苗後，女性仍有機會受其他未包括在疫苗內的高危 HPV 感染。因此，無論接種與否，凡年齡在 25 – 64 歲之間而曾有性經驗的女性，都應定期接受子宮頸細胞檢查。

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/ 家屬簽署： _____

病人/ 家屬姓名： _____

日期： _____

