

醫療程序資訊 - 皮膚手術的護理

Hosp No.	:	HKID No.:
0 1		

M/F

Case No. :

Name : DOB :

Adm Date : Contact No.:

1. 簡介

- 1.1. 於皮膚手術過程中,皮膚的一小部分組織被取出。局部麻醉的藥效會於手術 1-2 小時後逐漸消散,此時您可能於傷口位置開始感到疼痛。傷口疼痛可以維持數天,醫生會為你處方止痛藥緩解疼痛症狀。
- 1.2. 皮膚傷口以敷料覆蓋,需要定期更換以保持清潔。傷口避免接觸水及保持乾爽,以免引起傷口感染。
- **1.3.** 手術後將會安排覆診檢查傷口癒合情況,並更換包紮敷料。傷口手術線一般於第 **7-14** 天拆線,因應身體的部位而定。如傷口不用縫針,亦須要進行護理傷口直至傷口痊癒。
- 1.4. 如皮膚切片組織需要送往化驗,報告約於一周後取得結果,除非另作通知。

2. 手術傷口的護理

- 2.1. 不要弄濕傷口, 請保持傷口清潔和乾爽。
- **2.2.** 假如傷口有防水敷料覆蓋,您可以如常洗澡,但請不要洗刷傷口或用花灑灑水向傷口。而傷口未癒 合及拆除敷料前,應避免浸浴及游泳等活動。
- 2.3. 請暫停多流汗的活動,避免劇烈或拉扯傷口的運動。
- 2.4. 如傷口需要手術線縫合,請按醫療人員指示回本院門診進行拆線。

3. 預期手術傷口位置於頭數天會感到疼痛或輕微滲血。若出現以下情况,請聯絡我們

- 3.1. 持續滲血或傷口滲液。(若傷口持續滲血,請用消毒紗布按壓傷口及聯絡我們)。
- 3.2. 疼痛增加、傷口紅腫。
- 3.3. 發燒。
- 3.4. 其他異常情況或有任何詢問。

如有任何疑問,請向您的主診醫生查詢。

本人明白以上關於手術或程序之資訊;本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問,並獲得充分的解答。

病人/家屬簽署:	
病人/家屬姓名:	
日期:	



GSKL-F04C-R4-02/25 Page 1 of 1