

醫療程序資訊 – 鼻中隔成型術 / 粘膜下隔切除術

1. 簡介

- 1.1. 矯正彎曲的鼻中膈。
- 1.2. 適用情況：
 - 1.2.1. 鼻中膈彎曲引起的鼻塞。
 - 1.2.2. 鼻竇竇口引流阻塞導致的鼻竇炎。
 - 1.2.3. 鼻出血。
 - 1.2.4. 鼻中膈刺引致的頭痛。
 - 1.2.5. 提供其它鼻手術進路。
 - 1.2.6. 鼻中膈彎曲引致的歪鼻畸形。

2. 檢查前之準備

- 2.1. 有可能要接受術前檢查包括手術部位照X光、血液測試、肺部X光及心電圖等。
- 2.2. 外科醫生會向您解釋有關手術的原因、過程和可能出現的併發症，並簽署手術同意書。
- 2.3. 麻醉科醫生會作出術前評估、解釋將施行之麻醉方法及有關風險。
- 2.4. 請告知醫生任何藥物過敏史、常規藥物治療或病況。
- 2.5. 須在手術前8小時禁飲食。

3. 程序

- 3.1. 進行此手術須使用全身麻醉。
- 3.2. 醫生透過鼻內的切口，矯正彎曲的鼻中膈。

4. 手術後之復原

- 4.1. 手術後兩邊鼻孔可能會塞入鼻敷料，所以你可能要用口呼吸，敷料會於一至兩日後取走。
- 4.2. 取走敷料後可能有輕微出血。
- 4.3. 鼻水帶有小量血絲乃正常現象。假如流血持續不止，請前往急症室求診。
- 4.4. 手術後可能感到鼻塞和流鼻水，但會在2至3星期內消退。

5. 風險及併發症

- 5.1. 常見副作用和併發症($\geq 1\%$ 風險)
 - 5.1.1. 鼻出血。
 - 5.1.2. 持續鼻塞。
 - 5.1.3. 感染。
 - 5.1.4. 鼻腔黏連。
 - 5.1.5. 鼻中膈血腫。
 - 5.1.6. 鼻中膈穿孔。
- 5.2. 不常見的嚴重風險或併發症($<1\%$ 風險)
 - 5.2.1. 鼻樑塌陷 / 鼻小柱內陷。
 - 5.2.2. 失去嗅覺。
 - 5.2.3. 腦髓液鼻漏。
 - 5.2.4. 中毒性休克。
 - 5.2.5. 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡。



Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

醫療程序資訊 -
鼻中隔成型術 / 粘膜下隔切除術

6. 手術後跟進

7. 備註

8. 參考資料

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/家屬姓名：_____

日期：_____

