

醫療程序資訊 – 扁桃體切除術

1. 簡介

- 1.1. 切除扁桃體可減少復發性或慢性扁桃體炎。
- 1.2. 適用情況:
 - 1.2.1. 復發性或慢性扁桃體炎
 - 1.2.2. 扁桃體邊膿腫
 - 1.2.3. 阻塞性睡眠窒息症及鼾症
 - 1.2.4. 活組織檢查
 - 1.2.5. 扁桃體惡性腫瘤
 - 1.2.6. 手術進路

2. 檢查前之準備

- 2.1. 有可能要接受術前檢查，包括血液測試、肺部 X 光及心電圖等。
- 2.2. 外科醫生會向您解釋有關手術的原因、過程和可能出現的併發症，並簽署手術同意書。
- 2.3. 麻醉科醫生會作出術前評估、解釋將施行之麻醉方法及有關風險。
- 2.4. 請告知醫生任何藥物過敏史、常規藥物治療或病況。
- 2.5. 須在手術前 8 小時禁飲食。

3. 程序

- 3.1. 進行此手術須使用全身麻醉。
- 3.2. 外科醫生將會經口腔切除扁桃體。

4. 手術後之復原

- 4.1. 手術後會出現喉痛及少許吞咽困難，情況會持續數日。
- 4.2. 保持口腔清潔，勤漱口。
- 4.3. 唾液小量帶血乃屬正常。假如出現持續口腔出血，請立即前往就近急症室求診。

5. 風險及併發症

- 5.1. 常見副作用和併發症 ($\geq 1\%$ 風險)
 - 5.1.1. 出血
 - 5.1.2. 疼痛
 - 5.1.3. 感染
 - 5.1.4. 口腔／口咽部損傷
- 5.2. 不常見的嚴重風險或併發症 ($<1\%$ 風險)
 - 5.2.1. 牙齒損傷
 - 5.2.2. 下頷損傷
 - 5.2.3. 聲音改變
 - 5.2.4. 上呼吸道阻塞
 - 5.2.5. 術後肺水腫
 - 5.2.6. 頸椎損傷
 - 5.2.7. 由於手術或麻醉的嚴重併發引致死亡



Gleneagles Hospital
HONG KONG
港怡醫院

醫療程序資訊 – 扁桃體切除術

6.1. 請依期覆診。

7.1. 以上所提供的醫療程序資料只供參考，而對於某類病人或個別人士可能發生的風險或併發症未能盡錄。如有查詢，請與您的醫生聯絡。

8.1. Hospital Authority. Smart Patient Website.

本人明白以上關於手術或程序之資訊；本人亦有機會對病情及治療方案提出疑問，並獲得充分的解答。

病人/家屬簽署：_____

病人/家屬姓名：_____

日期：_____

